

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ

[監修] 川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生


○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです

- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入(鼻ですする)する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？

- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望めます。



第一三共株式会社

○フルミスト点鼻液 接種後の注意



- フルミスト点鼻液の**接種後30分間**は、
ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難など）
の急な副反応が起こることがあります。
医師とすぐに連絡を取れるように
しておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をして構いませんが、
激しい運動は避けましょう。
- 接種後に熱が出ることがあります。
気になる場合は、医師にご相談ください。
（フルミストを接種したことを）
（医師に伝えてください）
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、
重度の免疫不全者との密接な接触は
避けてください。
- 医師が認めた場合は、フルミスト点鼻液と
他のワクチンも同時に
接種することができます。
他のワクチン接種を希望される際は、
医師にご相談ください。



医療機関名



第一三共株式会社

【フルミスト点鼻チェックリスト】

※対象は2～18歳です

以下の方は接種できません

- ☐ 2歳未満の方
- ☐ 19歳以上の方
- ☐ ゼラチンアレルギーのある方
- ☐ 鶏卵、鶏肉などにアレルギーのある方
- ☐ 心臓、腎臓、肝臓、血液、発育障害等の基礎疾患のある方
- ☐ 過去にけいれんを起こしたことがある方
- ☐ 重度の喘息や喘鳴の症状がある方
- ☐ 過去に免疫異常の指摘や近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
- ☐ 副腎皮質ホルモン剤、免疫抑制剤（経口、注射）を使用中の方
- ☐ アスピリン服用中の方
- ☐ 妊娠中、妊娠の可能性のある方